



**Aksillaya güncel
yaklaşım**

- **Evreleme**
- **Prognoz tayini**
- **Hastalığın lokal kontrolu**





Düzeyle göre l.n. sayıları


- **Düzey I 9-13**
- **Düzey II5-9**
- **Düzey III 2-6**


Düzey III ALND

**yaşam beklentisine
katkısı yoktur**

buna karşılık koplikasyon oranlarında ciddi artışlara yol açmaktadır

Br J Cancer 2006.95.811-6






Aksiller diseksionun komplikasyonları

- **Ameliyat sırasında oluşabilecekler**
Arter,ven,sinir yaralanmaları

. Cerrahiye bağlı geç kompl.

üst ekstremitede lenfödem***

**aksillada doku kaybına
bağlı
kozmetik bozukluk**



Operasyon zamanı

***Duyu kaybı** (hipoestezi, yanma)


***Venöz tromboz**

***Scapula Alata** (winged scapula)


***Kol güçsüzlüğü**

***Kol hareketlerinde kısıtlanma**





29.10.2005 11:14



Evaluation of Muscle Atrophy after A

A. Gyedu*, I. Kepenekci*, B. Alic*, S. Akyar**

Department of General Surgery*, Department of Radio

Key words. Breast cancer ; axillary lymph node disse

Abstract. *Introduction :* Axillary node status is the m
carcinoma, making axillary lymph node dissection (AI
according to ALND is frequently reported. In this study

taktörler:

***Düzey III ALND**

***RX** (ALND %8 , ALND & RX %29 IntJ Radiat Oncol Biol Phys 1992;24.253-60)

***evrelemede N skoru**

***onkolojik ablasyon türü (MRM v.s.BCS)**

***Kemoterapi**


***Obezite**

***DM**

***Geçirilmiş aksilla cerrahisi**







**Meme kanseri tedavisine
soyunan her cerrahın
SLNB tekniklerini
uygulayabilmesi
gereklidir**







